

KHMER- WHOOPING COUGH VACCINATION IN PREGNANCY

ការចាក់ថ្នាំបង្ការរោគក្អកមាននៅពេលមានផ្ទៃពោះ

❖ តើរោគក្អកមានជាអ្វី?

- ក្អកមានគឺជារោគមួយដ៏ធ្ងន់ធ្ងរណាស់ដោយការចម្លងពីមេរោគបាក់តេរី។
- ក្អកមានអាចបង្កឲ្យការក្អកប្រកួតក្នុងពេលដំបូង ដោយធ្វើឲ្យទារកមានការពិបាកខ្លាំងក្នុងការដកដង្ហើម។
- ទារកខ្លះអាចមានផលពិបាកដ៏ធ្ងន់ធ្ងរក្នុងការលូតលាស់ដូចជាមាន៖ ជម្ងឺរលាកសួត និងការខូចដល់ខួរក្បាលផង។
- ទារកភាគច្រើនបានតម្រូវចូលទៅព្យាបាលក្នុងមន្ទីរពេទ្យពេលដែលរោគនេះកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរទារកអាចនឹងស្លាប់។

❖ តើអ្វីជាការចាក់ថ្នាំបង្ការរោគនេះ?

- ការចាក់ថ្នាំបង្ការរោគផ្សេងៗ គឺការពារដល់កុមារនិងមនុស្សពេញវ័យទាំងឡាយពីការបង្កនូវគ្រោះថ្នាក់ដោយការចម្លងមេរោគផ្សេងៗ។
- ការចាក់ថ្នាំបង្ការរោគបានបង្កើនឡើងនូវភាពការពារដល់ប្រព័ន្ធនៅក្នុងសរីរាង្គកាយដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងមេរោគចម្លងដ៏សាហាវមួយចំនួនដូចជា៖ រោគរលាកថ្លើមបើរោគក្អកមាន រោគកញ្ជិល រោគស្រឡាចនិងរោគស្លូត។
- ថ្នាំវ៉ាក់សាំងបង្ការរោគមានមួយចំនួនជាផ្នែកនៃមេរោគវិសុឬមេរោគបាក់តេរី ដោយផ្សំបន្ថែមនូវផ្នែកខ្លះទៀតដូចជាការរក្សាបណ្តុះផ្តាច់ទុកយ៉ូរឬមានសមាសធាតុខ្លះដើម្បីបង្កើននូវប្រព័ន្ធសុំនឹងរោគឲ្យបានកាន់តែប្រសើរឡើង។

❖ ហេតុអ្វីស្ត្រីមានផ្ទៃពោះគួរតែចាក់ថ្នាំវ៉ាក់សាំងសំរាប់បង្ការរោគក្អកមាននេះ?

- ការបានទទួលថ្នាំវ៉ាក់សាំងបង្ការរោគក្អកមានក្នុងខណៈស្ត្រីមានផ្ទៃពោះនឹងអាចជួយការពារដល់ទារកអ្នកពីការកើតមានរោគក្អកមាន ពេលប៉ុន្មានអាទិត្យដំបូងនៃជីវិតរបស់ទារក។
- សមាគមសុំរោគា ដែលអ្នកបានទទួលពីថ្នាំវ៉ាក់សាំងនេះនឹងបញ្ជូនទៅកាន់ទារករបស់អ្នកដោយឆ្លងកាត់តាមសុក។
- ទារកទាំងឡាយចាប់ផ្តើមការចាក់ថ្នាំបង្ការរោគក្អកមាននេះនៅពេលមានអាយុ 6 អាទិត្យ ប៉ុន្តែមិនប្រាកដជាអាចការពារពេញលេញបានទេ រហូតទាល់តែបន្ទាប់ពីទារក បានចាក់ថ្នាំចំនួន 2 ដូសទៀត ជាធម្មតាគឺពេលទារកបានអាយុ 4 ខែ។

❖ តើថ្នាំវ៉ាក់សាំងចាក់បង្ការរោគក្អកមាននេះ ប្រកបដោយសុវត្ថិភាពចំពោះស្ត្រីមានផ្ទៃពោះដែរ?

- គឺពិតជាប្រកបដោយសុវត្ថិភាព។ គឺគ្មានភ័ស្តុតាងដោយបញ្ជាក់ពីថ្នាំវ៉ាក់សាំងដែលមិនប្រកបដោយសុវត្ថិភាពមានដល់ម្តាយនិងទារកនោះឡើយ។
- គឺគ្មានភ័ស្តុតាងដោយបញ្ជាក់ពីថ្នាំវ៉ាក់សាំងអាចបណ្តាលឲ្យមានជម្ងឺណាមួយដល់ម្តាយក៏ដូចជាដល់ទារកឡើយ។

❖ ប្រសិនបើខ្ញុំបានចាក់ថ្នាំវ៉ាក់សាំងបង្ការរោគក្អករយៈពេលពី 2 ឆ្នាំកន្លងមក តើខ្ញុំត្រូវចាក់ថ្នាំបង្ការរោគនេះឡើយដែរ?

- គឺពិតណាស់ ដោយស្មើដល់ស្ត្រីមានផ្ទៃពោះទាំងឡាយត្រូវទទួលបានការថ្នាំវ៉ាក់សាំងបង្ការរោគនេះរាល់ពេលមានផ្ទៃពោះដោយមិនគិតតាំងពីពេលដែលគេបានចាក់ថ្នាំបង្ការនេះនៅពេលចុងក្រោយកន្លងមកក៏ដោយ។

❖ តើអ្នកអាចទទួលបានការចាក់ថ្នាំវ៉ាក់សាំងបង្ការរោគក្អកមានដោយឃ្លីបណាដែរ?

- ការចាក់ថ្នាំវ៉ាក់សាំងនេះ បានសូមស្នើឲ្យចាក់បង្ការនៅពេលត្រីមាសទី 3 ដោយគំនិតចងចាំនៅរវាងពេល 28 ទៅ 32 អាទិត្យ។
- ថ្នាំវ៉ាក់សាំងនេះគឺមានផ្តល់ជូននៅ៖
 - **MMC Clayton** (មន្ទីរពេទ្យម៉ូណាស់ឌីចតិន) កន្លែងចាក់ថ្នាំបង្ការរោគ **Monash Immunisation:** ផ្នែកអគារឯកជន នៅជាន់ទី 2 (**Private suite I Jessie MacPherson**) Level 2 ។
ទូរស័ព្ទលេខ: 9594 6320 ចាប់ធ្វើការពីម៉ោង 8.30 ព្រឹក ដល់ម៉ោង 4 រសៀល ពីថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រ។
(Monday to Friday from 8.30am – 4.00pm)
មិនចាំបាច់ធ្វើការណាត់ជួបឡើយ។
 - ប្រសិនបើអ្នកបានកក់កំណត់សំរាលនៅមន្ទីរពេទ្យ **Dandenong** ឬនៅ **Casey** មានផ្តល់ជូនផងដែរនៅ៖
 - **Dandenong**
មន្ទីរគ្លីនិកសំរាប់ការថែទាំដល់ស្ត្រីដែលមានផ្ទៃពោះ
 - **Casey**
មន្ទីរគ្លីនិក Pakenham សំរាប់ការថែទាំផ្ទៃពោះ។

OCTOBER 2016