

KHMER- ការបំបៅដោះនៅក្នុងសប្តាហ៍ដំបូងគឺសំរាប់ទារកទាំងពួងឲ្យប្រកបដោយសុខភាពដ៏ល្អពេញលេញ៖ អ្វីដែលអ្នកត្រូវការចង់ដឹង

(Breastfeeding in the first week for healthy full term babies: What you need to know)

ទារកទាំងឡាយមានភាពខុសៗគ្នាៗ ប្រសិនបើមានភាពព្រួយបារម្ភអ្វីមួយនោះ ចូរពិភាក្សាជាមួយធុបរបស់អ្នក

	ពេល 24 ម៉ោងដំបូង	ថ្ងៃទី 2 (24 ទៅ 48ម៉ោង)	ថ្ងៃទី 3 (48 ទៅ 72 ម៉ោង)	ថ្ងៃទី 4 (លើសពី 72 ម៉ោង)	ថ្ងៃទី 4 ទៅថ្ងៃទី 6	ថ្ងៃទី 7
ដោះទាំងពីរ	នៅទន់	នៅទន់	បន្ទាប់មកទឹកដោះឡើងពេញហើយឡើងវិញ។ សរសៃឡើងនៅលើដោះអាចមើលឃើញច្បាស់។	ដោះទាំងពីរឡើងពេញហើយឡើងវិញផង។	ទឹកដោះឡើងពេញទៅជាទន់ដោយការបំបៅដោះច្រើនផង។	ទឹកដោះឡើងពេញទៅជាទន់ដោយ ការបំបៅដោះច្រើនផង។
ទឹកដោះ	កូឡូស្ត្រូម (Colostrum) - មានចំនួនដ៏តិច ដោយមាននូវជីវជាតិជាច្រើន ល្បឿនខាប់ ផ្លា ពណ៌ទឹកក្រូច ប្រហែល 1/2 ទៅ 1 កូនស្លាបព្រា ពេលបំបៅ ម្តង។	កូឡូស្ត្រូម (Colostrum) ប្រហែល 1 ទៅ 2 កូនស្លាបព្រាពេលបំបៅម្តង។	ទឹកដោះចាប់ផ្តើមមានហូរចេញមកពណ៌ស	ទឹកដោះមាន សំបូរកាន់តែច្រើន	ពណ៌កាន់តែ ស	សំបូរកាន់តែច្រើនទៅតាមភាពតម្រូវការ។
ទារក	ដោយដាក់ផ្ទប់ស្បែកទារកទៅ នឹងស្បែកម្តាយ ចាប់ពីពេលកើត ការចាប់ផ្តើមបំបៅនៅពេល 2 ម៉ោងដំបូង។ បន្ទាប់បំបៅលើកដំបូងរួច មកទារកអាចគេងចាប់ពី 4 ទៅ 6 ម៉ោងឬ ឆាប់ភ្នាក់ នឹងត្រូវការបំបៅ ជាញឹកញាប់ផងដែរ។	ធម្មតាទារក តែងមានភាពជាសកម្មយ៉ាងមាំមួន និងច្រើនតែភ្នាក់។ ជាញឹកញាប់ទារកភ្នាក់យំមិនគេង ជាពិសេសនៅពេលយប់។ ភាគច្រើនបាត់យំហើយគេង នៅពេលលើកមកឱបក្រសោប ដោយដាក់ផ្ទប់ស្បែកទារកទៅនឹងស្បែកម្តាយ។	ទារកភាគច្រើនតែងនៅបន្តការភ្នាក់នឹងបៅច្រើនជាញឹកញាប់ ជាពិសេសនៅពេលយប់។ ពេលខ្លះទៀតទារកគេងលក់ដ៏យូរនៅរវាងពេលបៅរួចម្តងៗ។	ទារកភាគច្រើននៅតែបន្តការភ្នាក់ ហើយបៅជាញឹកញាប់។ ទារកអាចបីតដក់ហើយ លេបចូល ក្នុងរវាង 2 ទៅ 3នាទីបន្ទាប់មកសំរាកការបីតដក់ ទៅ 30វិនាទីរួចហើយ ក៏ចាប់ផ្តើមបីតដក់ជាបន្តទៀត៖ រួចលេបចូលដូចជាលំនាំដដែលឡើងវិញ។	ទារកបៅច្រើនញឹកញាប់នៅពេលយប់ និងគេងបានច្រើននៅពេលថ្ងៃ។	ការបំបៅច្រើនតម្រូវទៅតាមការឃ្លានរបស់ទារក ដែលធ្វើឲ្យរាងកាយអ្នកផលិតចេញទឹកដោះបានយ៉ាងច្រើនទៅតាមចំនួនត្រូវការរបស់ទារកអ្នក។

KHMER- ការបំបៅដោះនៅក្នុងសប្តាហ៍ដំបូងគឺសំរាប់ទារកទាំងពួងឲ្យប្រកបដោយសុខភាពដ៏ល្អពេញលេញ៖ អ្វីដែលអ្នកត្រូវការចង់ដឹង
(Breastfeeding in the first week for healthy full term babies: What you need to know)

ទារកទាំងឡាយមានភាពខុសៗគ្នា។ ប្រសិនបើមានភាពព្រួយបារម្ភអ្វីមួយនោះ ចូរពិភាក្សាជាមួយធុររបស់អ្នក

	ពេល 24 ម៉ោងដំបូង	ថ្ងៃទី 2 (24 ទៅ 48ម៉ោង)	ថ្ងៃទី 3 (48 ទៅ 72 ម៉ោង)	ថ្ងៃទី 4 (លើសពី 72 ម៉ោង)	ថ្ងៃទី 4 ទៅថ្ងៃទី 6	ថ្ងៃទី 7
ការបំបៅដោះ ទារកនឹងចំនួន នៃការច្របាច់ យកទឹកដោះ ប្រសិនបើ ជា ទារកមិនទាន់ មានសកម្មភាព ក្នុងការបំបៅ ដោះឡើយ។	ការបំបៅបានយ៉ាងតិចណាស់ ក៏បាន 3 ទៅ 4 ដង ហើយឬក៏ ច្របាច់យកទឹកដោះទុកបំបៅ ដែលអាចនឹងធ្វើទៅបានច្រើន ដងផង។ ចូរបំបៅដោះទាំងពីរនឹងដាក់ ដោយផ្ទុះស្បែកកូនទៅនឹង ស្បែកម្តាយ។ ទារកលេបចូល បន្ទាប់ពីបីឆ្នកជញ្ជក់បានមួយ ចំនួន។ ការច្របាច់យកទឹក ដោះដោយដៃ បើសិនជាទារក មិនអាចបីឆ្នកជញ្ជក់បាន។	ការបំបៅពី 6ដងឬលើសពី 8 ដង ហើយ/ ឬច្របាច់យកទឹក ដោះ។ បំបៅជាញឹកញយ បង្កើនទឹកដោះឲ្យមានកាន់តែ ច្រើនឡើង។ ជាញឹកញយ ដោយបំបៅទារកពី 1 ទៅ 3 ម៉ោង រួចឈប់ សំរាកពី 2ទៅ 3 ម៉ោង។ ត្រូវការពេលច្រើនក្នុង ការដាក់ ផ្ទុះស្បែកកូនទៅនឹង ស្បែកម្តាយ។ ការច្របាច់យក ទឹកដោះដៃ ប្រសិនបើទារក មិនអាចជញ្ជក់បាន។	ការបំបៅពី 8 ទៅ12ដង ហើយឬច្របាច់យកទឹក ដោះ។ ឮសំឡេងការបីត ជញ្ជក់នឹងការលេបចូល។ បំបៅម្តងទៀត ប្រសិនបើ ទារកនៅតែយំ។ ត្រូវការ ពេលច្រើនក្នុងការដាក់ផ្ទុះ ស្បែកកូនទៅនឹង ស្បែក ម្តាយ។ ការច្របាច់យកទឹកដោះ ដោយដៃ បើសិនជាទារក មិនអាចជញ្ជក់បាន។	ការបំបៅពី 8 ទៅ12 ដង ហើយ/ ឬ ច្របាច់ យកទឹកដោះ។ ចំនួនជា មធ្យមសំរាប់ការបំបៅ ដោះ 11 ដង ក្នុង 24 ម៉ោងអាចប្រើ ម៉ាស៊ីន ខ្សែភ្លើងបូមដោះ បើសិន ជាត្រូវការបូមយកទឹក ដោះ។	ការបំបៅពី 8 ទៅ 12 ដង ហើយ/ ឬ ច្របាច់ យកទឹកដោះ។ អាច ឃើញ ឬ ឮសូសំឡេង ក្នុង ការលេបចូល។ ការបំបៅចាប់ពីដោះ ម្ខាង រហូតទាល់តែធូរស្រួល ហើយ/ រួចបូរទៅដោះ ម្ខាងទៀតដោយយោង ទៅតាមសញ្ញា cues នៃការបំបៅរបស់ទារក។	ការបំបៅពី 8 ទៅ12 ដងហើយ/ ឬ ច្របាច់ យកទឹកដោះ។ ដោយយោងទៅតាម សញ្ញា cues នៃការ បំបៅរបស់ទារក។ ការគេងអោបំបៅនៅ ពេលថ្ងៃនឹងពេលល្ងាច គឺជាភាពធម្មតា។
ការជុះសោម	យ៉ាងតិចក៏កន្ទបទទឹក អស់ 1 ដៃរ។	យ៉ាងតិចក៏កន្ទបទទឹក អស់ 2 ដៃរ។	យ៉ាងតិចក៏កន្ទបទទឹកអស់ 2 ទៅ 3 ដៃរ។ មានពណ៌ផ្កាឈូកឬពណ៌ ទឹកក្រូចប្រលាក់ជាមលើ កន្ទបគឺជាភាពធម្មតា។	យ៉ាងតិចក៏កន្ទបទទឹក អស់ 3 ទៅ 4 មានពណ៌ ស្រាល។ កន្ទបទាំង ប៉ុន្មានធ្ងន់ទទឹកជោគ។	យ៉ាងតិចក៏កន្ទបទទឹក អស់ 4 ទៅ 6 មាន ពណ៌ស្រាល។ កន្ទប ទាំងប៉ុន្មានធ្ងន់ទទឹក ជោគ។	យ៉ាងតិចក៏កន្ទបទទឹក អស់ 6 មានពណ៌ ស្រាល។ កន្ទបទាំង ប៉ុន្មានធ្ងន់ទទឹកជោគ។
ការជុះលាមក	យ៉ាងតិចក៏ជុះ 1 ដង មាន លាមកក្រាស់ស្អិតខ្មៅ និង ពណ៌បៃតង។	យ៉ាងតិចក៏ជុះ 2 ដង មាន ពណ៌ខ្មៅ និង ពណ៌បៃតងមិន សូវស្អិត។	យ៉ាងតិចក៏ជុះ 3 ដង មាន លាមកឡើងជ្រាយ ពណ៌បៃតងនឹង ពណ៌ត្នោត។	លាមកឡើងជ្រាយ ឬរាតជាមានពណ៌ត្នោត ឬលឿង។	ជាញឹកញាប់ (អាចនឹង មាននៅពេលបំបៅ ម្តងៗ)។ រាតជាទឹក ផុកៗ ពណ៌លឿងមាន ដុំតូចៗផង។	ជាញឹកញាប់យ៉ាងតិច ក៏ជុះ 2 ដងក្នុងមួយ ថ្ងៃ រាតជាទឹកឬផុកៗ ពណ៌លឿងមានដុំ តូចៗផង។